

# Anexo 1. Tablas suplementarias

Tabla suplementaria 1. Características basales de la muestra y consumo de alcohol. Comparación entre las personas participantes con la puntuación más baja en el MMSE-37 frente al resto

	MUJERES				HOMBRES			
	≤ P25 (n = 182)	> P25 (n = 325)	TOTAL (n = 507)	P	≤ P25 (n = 115)	> P25 (n = 340)	TOTAL (n = 455)	P
<b>Edad<sup>1</sup></b>	70,00 [65,00-72,00]	66,00 [61,00-70,00]	67,00 [62,00-71,00]	< 0,001 <sup>a</sup>	70,00 [65,00-73,00]	66,00 [61,00-70,00]	67,00 [62,00-71,00]	< 0,001 <sup>a</sup>
<b>Nivel de estudios<sup>2</sup></b>								
No escolarizado-primarios	152 (85,4)	178 (54,9)	330 (65,7)	< 0,001 <sup>b</sup>	96 (85,7)	161 (47,9)	257 (57,4)	< 0,001 <sup>b</sup>
Secundaria-superiores	26 (14,6)	146 (45,1)	172 (34,3)		16 (14,3)	175 (52,1)	191 (42,6)	
<b>Tipo de convivencia</b>								
Vive solo	37 (20,6%)	58 (18,0%)	95 (18,9%)	0,713 <sup>c</sup>	17 (14,9)	30 (8,8)	47 (10,4)	0,282 <sup>b</sup>
Vive con una o más personas	143 (79,4%)	263 (81,7%)	406 (80,9%)		96 (84,2)	306 (90,3)	402 (88,7)	
Vive en institución	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)		1 (0,9)	2 (0,6)	3 (0,7)	
Otros	0 (0%)	1 (0,3%)	1 (0,2%)		0 (0)	1 (0,3)	1 (0,2)	
<b>Tabaquismo<sup>2</sup></b>								
No fumadores	135 (75,4)	193 (59,8)	328 (65,3)	0,002 <sup>b</sup>	32 (28,3)	81 (23,8)	113 (24,9)	0,375 <sup>b</sup>
Fumadores	16 (8,9)	45 (13,9)	61 (12,2)		21 (18,6)	53 (15,6)	74 (16,3)	
Exfumadores	28 (15,6)	85 (26,3)	113 (22,5)		60 (53,1)	206 (60,6)	266 (58,7)	
<b>Sedentarismo<sup>2</sup></b>	141 (77,9)	201 (62,2)	342 (67,9)	< 0,001 <sup>b</sup>	85 (75,2)	203 (60,1)	288 (63,9)	0,005 <sup>b</sup>
<b>Hipertensión<sup>2</sup></b>	97 (53,3)	137 (42,2)	234 (46,2)	0,020 <sup>b</sup>	63 (54,8)	164 (48,2)	227 (49,9)	0,269 <sup>b</sup>
<b>Diabetes mellitus<sup>2</sup></b>	34 (18,7)	34 (10,5)	68 (13,4)	0,014 <sup>b</sup>	35 (30,4)	81 (23,8)	116 (25,5)	0,200 <sup>b</sup>
<b>Dislipemia<sup>2</sup></b>	105 (57,7)	156 (48,0)	261 (51,5)	0,045 <sup>b</sup>	51 (44,3)	185 (54,4)	236 (51,9)	0,079 <sup>b</sup>
<b>Fibrilación auricular<sup>2</sup></b>	4 (2,2)	9 (2,8)	13 (2,6)	0,778 <sup>c</sup>	9 (7,8)	26 (7,6)	35 (7,7)	1,000 <sup>b</sup>
<b>Depresión<sup>2</sup></b>	36 (22,8)	56 (20,3)	92 (21,2)	0,624 <sup>b</sup>	12 (13,8)	24 (7,9)	36 (9,2)	0,142 <sup>b</sup>
<b>Tratamientos SNC<sup>1</sup></b>	60 (33,0)	92 (28,3)	152 (30,0)	0,319 <sup>b</sup>	26 (22,6)	56 (16,5)	82 (18,0)	0,180 <sup>b</sup>
<b>IMC<sup>1</sup></b>	28,13 [25,15-31,17]	26,98 [24,70-30,36]	27,55 [24,80-30,50]	0,053 <sup>a</sup>	29,35 [27,22-31,14]	28,55 [26,46-30,48]	28,67 [26,59-30,76]	0,204 <sup>a</sup>
<b>TAS<sup>1</sup></b>	131,00 [120,00-140,00]	130,00 [120,00-140,00]	130,00 [120,00-140,00]	0,041 <sup>a</sup>	132,00 [120,00-143,50]	132,00 [121,00-140,00]	132,00 [120,50-142,00]	0,879 <sup>a</sup>
<b>TAD<sup>1</sup></b>	75,00 [70,00-80,00]	75,00 [70,00-80,00]	75,00 [70,00-80,00]	0,664 <sup>a</sup>	76,00 [70,00-84,50]	77,50 [70,00-85,00]	77,00 [70,00-85,00]	0,272 <sup>a</sup>
<b>Colesterol total<sup>1</sup></b>	197,00 [174,00-226,75]	211,00 [187,00-233,25]	207,00 [182,00-230,75]	< 0,001 <sup>a</sup>	186,00 [163,00-209,75]	186,00 [158,50-213,75]	186,00 [160,00-212,25]	0,828 <sup>a</sup>
<b>cHDL<sup>1</sup></b>	56,00 [47,00-64,00]	58,00 [50,00-69,00]	57,00 [49,00-67,00]	0,029 <sup>a</sup>	47,00 [37,50-56,50]	48,00 [41,00-56,25]	48,00 [40,00-56,50]	0,296 <sup>a</sup>
<b>REGICOR<sup>2</sup></b>								
RCV bajo	133 (77,8)	249 (79,8)	382 (79,1)	0,812 <sup>b</sup>	27 (27,8)	116 (41,6)	143 (38,0)	0,018 <sup>b</sup>
RCV moderado	33 (19,3)	53 (17,0)	86 (17,8)		46 (47,4)	122 (43,7)	168 (44,7)	
RCV alto	5 (2,9)	10 (3,2)	15 (3,1)		24 (24,7)	41 (14,7)	65 (17,3)	
<b>FRESCO<sup>2</sup></b>								
RCV bajo	87 (89,7)	195 (94,7)	282 (93,1)	0,145 <sup>c</sup>	27 (40,9)	106 (58,6)	133 (53,8)	0,020 <sup>b</sup>
RCV moderado	10 (10,3)	11 (5,3)	21 (6,9)		29 (43,9)	63 (34,8)	92 (37,2)	
RCV alto	0 (0)	0 (0)	0 (0)		10 (15,2)	12 (6,6)	22 (8,9)	

<sup>1</sup> mediana [Q1-Q3]; <sup>2</sup> n (%); <sup>a</sup> prueba U de Mann Whitney; <sup>b</sup> prueba chi-cuadrado; <sup>c</sup> prueba exacta de Fisher.

cHDL: colesterol de lipoproteínas de alta densidad; FRESCO: Función de Riesgo Española de acontecimientos Coronarios y Otros; IMC: índice de masa corporal; MMSE-37: versión de 37 ítems del Mini-Mental State Examination; RCV: riesgo cardiovascular; REGICOR: Registre Gironi del COR; TAD: tensión arterial diastólica (mmHg); TAS: tensión arterial sistólica (mmHg); tratamientos; SNC: tratamientos que modulan el sistema nervioso central.

Tabla suplementaria 2. Características basales de la muestra y consumo de alcohol. Comparación entre las personas participantes con la peor puntuación en la prueba de memoria inmediata frente al resto

	MUJERES				HOMBRES			
	≤ P25 (n = 171)	> P25 (n = 335)	TOTAL (n = 506)	P	≤ P25 (n = 185)	> P25 (n = 269)	TOTAL (n = 454)	P
<b>Edad<sup>1</sup></b>	69,00 [64,00-72,00]	66,00 [61,00-71,00]	67,00 [62,00-71,00]	< 0,001 <sup>a</sup>	69,00 [65,00-73,00]	65,00 [61,00-70,00]	67,00 [62,00-71,00]	< 0,001 <sup>a</sup>
<b>Nivel de estudios<sup>2</sup></b>								
No escolarizado-primarios	117 (68,8)	212 (64,0)	329 (65,7)	0,334 <sup>b</sup>	108 (59,7)	149 (56,0)	257 (57,5)	0,503 <sup>b</sup>
Secundaria-superiores	53 (31,2)	119 (36,0)	172 (34,3)		73 (40,3)	117 (44,0)	190 (42,5)	
<b>Tipo de convivencia</b>								
Vive solo	37 (21,9%)	58 (17,5%)	95 (19,0%)	0,457 <sup>c</sup>	18 (9,8)	29 (10,8)	47 (10,4)	0,834 <sup>b</sup>
Vive con una o más personas	132 (78,1%)	273 (82,2%)	405 (80,8%)		164 (89,6)	237 (88,1)	401 (88,7)	
Vive en institución	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)		1 (0,5)	2 (0,7)	3 (0,7)	
Otros	0 (0%)	1 (0,3%)	1 (0,2%)		0 (0)	1 (0,4)	1 (0,2)	
<b>Tabaquismo<sup>2</sup></b>								
No fumadores	120 (71,0)	207 (62,3)	327 (65,3)	0,120 <sup>b</sup>	52 (28,4)	60 (22,3)	112 (24,8)	0,074 <sup>b</sup>
Fumadores	15 (8,9)	46 (13,9)	61 (12,2)		22 (12,0)	52 (19,3)	74 (16,4)	
Exfumadores	34 (20,1)	79 (23,8)	113 (22,6)		109 (59,6)	157 (58,4)	266 (58,8)	
<b>Sedentarismo<sup>2</sup></b>	123 (72,4)	218 (65,5)	341 (67,8)	0,144 <sup>b</sup>	114 (62,6)	174 (64,9)	288 (64,0)	0,692 <sup>b</sup>
<b>Hipertensión<sup>2</sup></b>	76 (44,4)	157 (46,9)	233 (46,0)	0,673 <sup>b</sup>	95 (51,4)	132 (49,1)	227 (50,0)	0,702 <sup>b</sup>
<b>Diabetes mellitus<sup>2</sup></b>	21 (12,3)	46 (13,7)	67 (13,2)	0,751 <sup>b</sup>	46 (24,9)	70 (26,0)	116 (25,6)	0,866 <sup>b</sup>
<b>Dislipemia<sup>2</sup></b>	88 (51,5)	172 (51,3)	260 (51,4)	1,000 <sup>b</sup>	94 (50,8)	142 (52,8)	236 (52,0)	0,750 <sup>b</sup>
<b>Fibrilación auricular<sup>2</sup></b>	2 (1,2)	11 (3,3)	13 (2,6)	0,235 <sup>c</sup>	13 (7,0)	22 (8,2)	35 (7,7)	0,785 <sup>b</sup>
<b>Depresión<sup>2</sup></b>	35 (23,8)	57 (19,9)	92 (21,2)	0,418 <sup>b</sup>	20 (13,0)	16 (6,8)	36 (9,2)	0,059 <sup>b</sup>
<b>Tratamientos SNC<sup>1</sup></b>	53 (31,0)	99 (29,6)	152 (30,0)	0,816 <sup>b</sup>	37 (20,0)	45 (16,7)	82 (18,1)	0,444 <sup>b</sup>
<b>IMC<sup>1</sup></b>	27,43 [24,94-29,75]	27,72 [24,78-30,86]	27,55 [24,79-30,51]	0,354 <sup>a</sup>	28,73 [26,81-30,24]	28,63 [26,47-31,08]	28,69 [26,61-30,76]	0,373 <sup>a</sup>
<b>TAS<sup>1</sup></b>	130,00 [120,00-140,00]	130,00 [120,00-140,00]	130,00 [120,00-140,00]	0,591 <sup>a</sup>	131,00 [120,00-141,00]	134,00 [124,00-142,00]	132,00 [121,00-142,00]	0,355 <sup>a</sup>
<b>TAD<sup>1</sup></b>	75,00 [70,00-80,00]	75,00 [70,00-80,00]	75,00 [70,00-80,00]	0,466 <sup>a</sup>	76,00 [70,00-83,00]	78,00 [70,00-85,00]	77,00 [70,00-85,00]	0,481 <sup>a</sup>
<b>Colesterol total<sup>1</sup></b>	205,00 [183,00-231,00]	208,00 [182,00-230,75]	207,00 [182,00-231,00]	0,758 <sup>a</sup>	188,00 [161,75-211,25]	185,00 [159,00-213,00]	186,00 [160,00-212,50]	0,723 <sup>a</sup>
<b>cHDL<sup>1</sup></b>	57,00 [49,00-68,00]	57,00 [49,00-66,25]	57,00 [49,00-67,00]	0,915 <sup>a</sup>	49,00 [40,00-60,00]	46,00 [39,25-55,00]	48,00 [40,00-56,00]	0,072 <sup>a</sup>
<b>REGICOR<sup>2</sup></b>								
RCV bajo	125 (76,7)	257 (80,6)	382 (79,3)	0,368 <sup>b</sup>	65 (40,6)	77 (35,8)	142 (37,9)	0,374 <sup>b</sup>
RCV moderado	34 (20,9)	51 (16,0)	85 (17,6)		65 (40,6)	103 (47,9)	168 (44,8)	
RCV alto	4 (2,5)	11 (3,4)	15 (3,1)		30 (18,8)	35 (16,3)	65 (17,3)	
<b>FRESCO<sup>2</sup></b>								
RCV bajo	98 (87,5)	184 (96,3)	282 (93,1)	0,005 <sup>c</sup>	47 (45,2)	85 (59,9)	132 (53,7)	0,066 <sup>b</sup>
RCV moderado	14 (12,5)	7 (3,7)	21 (6,9)		47 (45,2)	45 (31,7)	92 (37,4)	
RCV alto	0 (0)	0 (0)	0 (0)		10 (9,6)	12 (8,5)	22 (8,9)	

<sup>1</sup> mediana [Q1-Q3]; <sup>2</sup> n (%); <sup>a</sup> prueba U de Mann Whitney; <sup>b</sup> prueba chi-cuadrado; <sup>c</sup> prueba exacta de Fisher.

cHDL: colesterol de lipoproteínas de alta densidad; FRESCO: Función de Riesgo Española de acontecimientos Coronarios y Otros; IMC: índice de masa corporal; RCV: riesgo cardiovascular; REGICOR: Registre Gironi del COR; TAD: tensión arterial diastólica (mmHg); TAS: tensión arterial sistólica (mmHg); tratamientos SNC: tratamientos que modulan el sistema nervioso central.

Tabla suplementaria 3. Características basales de la muestra y consumo de alcohol. Comparación entre las personas participantes con la peor puntuación en la prueba de recuerdo diferido frente al resto

	MUJERES				HOMBRES			
	≤ P25 (n = 183)	> P25 (n = 322)	TOTAL (n = 505)	P	≤ P25 (n = 182)	> P25 (n = 273)	TOTAL (n = 455)	P
<b>Edad<sup>1</sup></b>	69,00 [64,00-72,00]	66,00 [61,25-71,00]	67,00 [62,00-71,00]	0,002 <sup>a</sup>	68,50 [65,00-72,00]	65,00 [61,00-70,00]	67,00 [62,00-71,00]	< 0,001 <sup>a</sup>
<b>Nivel de estudios<sup>2</sup></b>								
No escolarizado-primarios	120 (66,7)	208 (65,0)	328 (65,6)	0,781 <sup>b</sup>	107 (60,8)	150 (55,1)	257 (57,4)	0,279 <sup>b</sup>
Secundaria-superiores	60 (33,3)	112 (35,0)	172 (34,4)		69 (39,2)	122 (44,9)	191 (42,6)	
<b>Tipo de convivencia</b>								
Vive solo	39 (21,5%)	56 (17,6%)	95 (19,0%)	0,165 <sup>c</sup>	15 (8,3)	32 (1,7)	47 (10,4)	0,411 <sup>b</sup>
Vive con una o más personas	141 (77,9%)	263 (82,4%)	404 (80,8%)		163 (90,6)	239 (87,5)	402 (88,7)	
Vive en institución	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)		2 (1,1)	1 (0,4)	3 (0,7)	
Otros	1 (0,6%)	0 (0%)	1 (0,2%)		0 (0)	1 (0,4)	1 (0,2)	
<b>Tabaquismo<sup>2</sup></b>								
No fumadores	126 (69,6)	200 (62,7)	326 (65,2)	0,288 <sup>b</sup>	51 (28,3)	62 (22,7)	113 (24,9)	0,106 <sup>b</sup>
Fumadores	20 (11,0)	41 (12,9)	61 (12,2)		22 (12,2)	52 (19,0)	74 (16,3)	
Exfumadores	35 (19,3)	78 (24,5)	113 (22,6)		107 (59,4)	159 (58,2)	266 (58,7)	
<b>Sedentarismo<sup>2</sup></b>	132 (72,5)	209 (65,3)	341 (67,9)	0,117 <sup>b</sup>	111 (62,0)	177 (65,1)	288 (63,9)	0,574 <sup>b</sup>
<b>Hipertensión<sup>2</sup></b>	80 (43,7)	152 (47,2)	232 (45,9)	0,507 <sup>b</sup>	95 (52,2)	132 (48,4)	227 (49,9)	0,479 <sup>b</sup>
<b>Diabetes mellitus<sup>2</sup></b>	23 (12,6)	44 (13,7)	67 (13,3)	0,832 <sup>b</sup>	42 (23,1)	74 (27,1)	116 (25,5)	0,392 <sup>b</sup>
<b>Dislipemia<sup>2</sup></b>	88 (48,1)	172 (53,4)	260 (51,5)	0,290 <sup>b</sup>	88 (48,4)	148 (54,2)	236 (51,9)	0,258 <sup>b</sup>
<b>Fibrilación auricular<sup>2</sup></b>	4 (2,2)	9 (2,8)	13 (2,6)	0,777 <sup>c</sup>	12 (6,6)	23 (8,4)	35 (7,7)	0,590 <sup>b</sup>
<b>Depresión<sup>2</sup></b>	40 (25,0)	52 (19,1)	92 (21,3)	0,187 <sup>b</sup>	19 (12,3)	17 (7,2)	36 (9,2)	0,130 <sup>b</sup>
<b>Tratamientos SNC<sup>1</sup></b>	67 (36,6)	85 (26,4)	152 (30,1)	0,021 <sup>b</sup>	32 (17,6)	50 (18,3)	82 (18,0)	0,940 <sup>b</sup>
<b>IMC<sup>1</sup></b>	27,56 [25,11-30,00]	27,55 [24,58-30,86]	27,55 [24,81-30,53]	0,847 <sup>a</sup>	29,05 [27,22-30,32]	28,40 [26,22-30,86]	28,67 [26,59-30,76]	0,360 <sup>a</sup>
<b>TAS<sup>1</sup></b>	130,00 [120,00-140,00]	130,00 [120,00-140,00]	130,00 [120,00-140,00]	0,693 <sup>a</sup>	132,00 [120,25-140,00]	132,00 [121,00-143,00]	132,00 [120,50-142,00]	0,361 <sup>a</sup>
<b>TAD<sup>1</sup></b>	75,00 [70,00-80,00]	76,00 [70,00-80,00]	75,00 [70,00-80,00]	0,100 <sup>a</sup>	77,00 [70,00-85,00]	77,00 [70,00-85,00]	77,00 [70,00-85,00]	0,584 <sup>a</sup>
<b>Colesterol total<sup>1</sup></b>	206,50 [183,25-232,75]	208,00 [182,00-228,75]	207,50 [182,00-231,00]	0,330 <sup>a</sup>	185,00 [162,00-211,00]	186,00 [157,75-213,00]	186,00 [160,00-212,25]	0,935 <sup>a</sup>
<b>cHDL<sup>1</sup></b>	57,00 [49,00-69,00]	57,00 [48,00-67,00]	57,00 [49,00-67,00]	0,298 <sup>a</sup>	49,00 [40,25-60,00]	47,00 [39,00-54,00]	48,00 [40,00-56,50]	0,123 <sup>a</sup>
<b>REGICOR<sup>2</sup></b>								
RCV bajo	135 (79,9)	246 (78,8)	381 (79,2)	0,518 <sup>b</sup>	65 (41,7)	78 (35,5)	143 (38,0)	0,422 <sup>b</sup>
RCV moderado	27 (16,0)	58 (18,6)	85 (17,7)		64 (41,0)	104 (47,3)	168 (44,7)	
RCV alto	7 (4,1)	8 (2,6)	15 (3,1)		27 (17,3)	38 (17,3)	65 (17,3)	
<b>FRESCO<sup>2</sup></b>								
RCV bajo	102 (88,7)	179 (95,7)	281 (93,0)	0,034 <sup>c</sup>	50 (47,2)	83 (58,9)	133 (53,8)	0,130 <sup>b</sup>
RCV moderado	13 (11,3)	8 (4,3)	21 (7,0)		47 (44,3)	45 (31,9)	92 (37,2)	
RCV alto	0 (0)	0 (0)	0 (0)		9 (8,5)	13 (9,2)	22 (8,9)	

<sup>1</sup> mediana [Q1-Q3]; <sup>2</sup> n (%); <sup>a</sup> prueba U de Mann Whitney; <sup>b</sup> prueba chi-cuadrado; <sup>c</sup> prueba exacta de Fisher.

cHDL: colesterol de lipoproteínas de alta densidad; FRESCO: Función de Riesgo Española de acontecimientos Coronarios y Otros; IMC: índice de masa corporal; RCV: riesgo cardiovascular; REGICOR: Registre Gironí del COR; TAD: tensión arterial diastólica (mmHg); TAS: tensión arterial sistólica (mmHg); tratamientos SNC: tratamientos que modulan el sistema nervioso central.

Tabla suplementaria 4. Características basales de la muestra y consumo de alcohol. Comparación entre las personas participantes con la peor puntuación en la prueba de acentuación de palabras frente al resto

	MUJERES				HOMBRES			
	≤ P25 (n = 183)	> P25 (n = 322)	TOTAL (n = 505)	P	≤ P25 (n = 182)	> P25 (n = 273)	TOTAL (n = 455)	P
<b>Edad<sup>1</sup></b>	70,00 [65,00-72,00]	66,00 [61,00-71,00]	67,00 [62,00-71,00]	< 0,001 <sup>a</sup>	70,00 [64,00-73,00]	65,00 [61,00-70,00]	67,00 [62,00-71,00]	< 0,001 <sup>a</sup>
<b>Nivel de estudios<sup>2</sup></b>								
No escolarizado-primarios	123 (94,6)	200 (54,9)	323 (65,4)	< 0,001 <sup>b</sup>	116 (92,1)	134 (42,7)	250 (56,8)	< 0,001 <sup>b</sup>
Secundaria-superiores	7 (5,4)	164 (45,1)	171 (34,6)		10 (7,9)	180 (57,3)	190 (43,2)	
<b>Tipo de convivencia</b>								
Vive solo	27 (20,6%)	66 (18,2%)	93 (18,8%)	0,708 <sup>c</sup>	18 (14,2)	27 (8,5)	45 (10,1)	0,198 <sup>b</sup>
Vive con una o más personas	104 (79,4%)	296 (81,5%)	400 (81,0%)		109 (85,8)	286 (90,2)	395 (89,0)	
Vive en institución	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)		0 (0)	3 (0,9)	3 (0,7)	
Otros	0 (0%)	1 (0,3%)	1 (0,2%)		0 (0)	1 (0,3)	1 (0,2)	
<b>Tabaquismo<sup>2</sup></b>								
No fumadores	106 (80,3)	216 (59,7)	322 (65,2)	< 0,001 <sup>b</sup>	42 (33,1)	71 (22,3)	113 (25,4)	0,063 <sup>b</sup>
Fumadores	10 (7,6)	51 (14,1)	61 (12,3)		19 (15,0)	55 (17,3)	74 (16,6)	
Exfumadores	16 (12,1)	95 (26,2)	111 (22,5)		66 (52,0)	192 (60,4)	258 (58,0)	
<b>Sedentarismo<sup>2</sup></b>	106 (80,3)	230 (63,2)	336 (67,7)	< 0,001 <sup>b</sup>	83 (65,4)	198 (62,9)	281 (63,6)	0,701 <sup>b</sup>
<b>Hipertensión<sup>2</sup></b>	78 (59,1)	149 (40,7)	227 (45,6)	< 0,001 <sup>b</sup>	67 (52,3)	155 (48,7)	222 (49,8)	0,560 <sup>b</sup>
<b>Diabetes mellitus<sup>2</sup></b>	26 (19,7)	41 (11,2)	67 (13,5)	0,021 <sup>b</sup>	35 (27,3)	79 (24,8)	114 (25,6)	0,669 <sup>b</sup>
<b>Dislipemia<sup>2</sup></b>	65 (49,2)	192 (52,5)	257 (51,6)	0,594 <sup>b</sup>	57 (44,5)	174 (54,7)	231 (51,8)	0,065 <sup>b</sup>
<b>Fibrilación auricular<sup>2</sup></b>	4 (3,0)	9 (2,5)	13 (2,6)	0,752 <sup>c</sup>	9 (7,0)	26 (8,2)	35 (7,8)	0,832 <sup>b</sup>
<b>Depresión<sup>2</sup></b>	24 (21,2)	68 (21,7)	92 (21,5)	1,000 <sup>b</sup>	11 (10,9)	25 (8,8)	36 (9,4)	0,682 <sup>b</sup>
<b>Tratamientos SNC<sup>1</sup></b>	41 (31,1)	110 (30,1)	151 (30,3)	0,916 <sup>b</sup>	20 (15,6)	61 (19,2)	81 (18,2)	0,456 <sup>b</sup>
<b>IMC<sup>1</sup></b>	28,84 [26,31-32,82]	26,70 [24,42-30,00]	27,47 [24,78-30,48]	< 0,001 <sup>a</sup>	29,08 [27,19-31,02]	28,36 [26,42-30,51]	28,64 [26,50-30,76]	0,122 <sup>a</sup>
<b>TAS<sup>1</sup></b>	130,00 [120,00-140,00]	130,00 [120,00-140,00]	130,00 [120,00-140,00]	0,123 <sup>a</sup>	135,00 [121,00-145,00]	131,50 [120,00-140,00]	132,00 [120,00-141,75]	0,180 <sup>a</sup>
<b>TAD<sup>1</sup></b>	75,00 [70,00-80,00]	75,00 [70,00-80,00]	75,00 [70,00-80,00]	0,768 <sup>a</sup>	76,50 [70,00-83,00]	77,00 [70,00-85,00]	77,00 [70,00-85,00]	0,646 <sup>a</sup>
<b>Colesterol total<sup>1</sup></b>	198,50 [172,75-224,50]	210,00 [185,00-231,00]	207,00 [182,00-230,00]	0,010 <sup>a</sup>	189,00 [164,50-213,00]	184,00 [157,00-212,25]	186,00 [160,50-213,00]	0,432 <sup>a</sup>
<b>cHDL<sup>1</sup></b>	56,00 [47,00-63,00]	58,00 [50,00-69,00]	57,00 [49,00-67,00]	0,019 <sup>a</sup>	48,00 [38,00-54,00]	47,00 [40,00-58,00]	48,00 [40,00-56,00]	0,256 <sup>a</sup>
<b>REGICOR<sup>2</sup></b>								
RCV bajo	95 (75,4)	279 (80,2)	374 (78,9)	0,487 <sup>b</sup>	26 (23,4)	113 (43,6)	139 (37,6)	< 0,001 <sup>b</sup>
RCV moderado	27 (21,4)	58 (16,7)	85 (17,9)		57 (51,4)	109 (42,1)	166 (44,9)	
RCV alto	4 (3,2)	11 (3,2)	15 (3,2)		28 (25,2)	37 (14,3)	65 (17,6)	
<b>FRESCO<sup>2</sup></b>								
RCV bajo	69 (86,3)	207 (95,4)	276 (92,9)	0,010 <sup>c</sup>	35 (46,7)	95 (56,5)	130 (53,5)	0,147 <sup>b</sup>
RCV moderado	11 (13,8)	10 (4,6)	21 (7,1)		30 (40,0)	62 (36,9)	92 (37,9)	
RCV alto	0 (0)	0 (0)	0 (0)		10 (13,3)	11 (6,5)	21 (8,6)	

<sup>1</sup> mediana [Q1-Q3]; <sup>2</sup> n (%); <sup>a</sup> prueba U de Mann Whitney; <sup>b</sup> prueba chi-cuadrado; <sup>c</sup> prueba exacta de Fisher.

cHDL: colesterol de lipoproteínas de alta densidad; FRESCO: Función de Riesgo Española de acontecimientos Coronarios y Otros; IMC: índice de masa corporal; RCV: riesgo cardiovascular; REGICOR: Registre Gironí del COR; TAD: tensión arterial diastólica (mmHg); TAS: tensión arterial sistólica (mmHg); tratamientos; SNC: tratamientos que modulan el sistema nervioso central.

Tabla suplementaria 5. Características basales de la muestra y consumo de alcohol. Comparación entre las personas participantes con la peor puntuación en la prueba de fluidez verbal frente al resto

	MUJERES				HOMBRES			
	≤ P25 (n = 166)	> P25 (n = 337)	TOTAL (n = 503)	P	≤ P25 (n = 114)	> P25 (n = 341)	TOTAL (n = 455)	P
<b>Edad<sup>1</sup></b>	70,00 [65,25-72,00]	66,00 [61,00-71,00]	67,00 [62,00-71,00]	< 0,001 <sup>a</sup>	70,00 [66,25-73,00]	65,00 [61,00-71,00]	67,00 [62,00-71,00]	< 0,001 <sup>a</sup>
<b>Nivel de estudios<sup>2</sup></b>								
No escolarizado-primarios	127 (77,9)	199 (59,4)	326 (65,5)	< 0,001 <sup>b</sup>	85 (75,2)	172 (51,3)	257 (57,4)	< 0,001 <sup>b</sup>
Secundaria-superiores	36 (22,1)	136 (40,6)	172 (34,5)		28 (24,8)	163 (48,7)	191 (42,6)	
<b>Tipo de convivencia</b>								
Vive solo	42 (25,8%)	51 (15,2%)	93 (18,7%)	0,009 <sup>c</sup>	17 (15,0)	30 (8,8)	47 (10,4)	0,192 <sup>b</sup>
Vive con 1o más personas	121 (74,2%)	283 (84,5%)	404 (81,1%)		96 (85,0)	306 (90,0)	402 (88,7)	
Vive en institución	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)		0 (0)	3 (0,9)	3 (0,7)	
Otros	0 (0%)	1 (0,3%)	1 (0,2%)		0 (0)	1 (0,3)	1 (0,2)	
<b>Tabaquismo<sup>2</sup></b>								
No fumadores	126 (77,3)	198 (59,1)	324 (65,1)	< 0,001 <sup>b</sup>	26 (23,2)	87 (25,5)	113 (24,9)	0,630 <sup>b</sup>
Fumadores	9 (5,5)	52 (15,5)	61 (12,2)		16 (14,3)	58 (17,0)	74 (16,3)	
Ex-Fumadores	28 (17,2)	85 (25,4)	113 (22,7)		70 (62,5)	196 (57,5)	266 (58,7)	
<b>Sedentarismo<sup>2</sup></b>	126 (76,4)	213 (63,6)	339 (67,8)	0,006 <sup>b</sup>	78 (69,6)	210 (61,9)	288 (63,9)	0,175 <sup>b</sup>
<b>Hipertensión<sup>2</sup></b>	96 (57,8)	136 (40,4)	232 (46,1)	<0,001 <sup>b</sup>	63 (55,3)	164 (48,1)	227 (49,9)	0,224 <sup>b</sup>
<b>Diabetes mellitus<sup>2</sup></b>	31 (18,7)	37 (11,0)	68 (13,5)	0,025 <sup>b</sup>	40 (35,1)	76 (22,3)	116 (25,5)	0,010 <sup>b</sup>
<b>Dislipemia<sup>2</sup></b>	79 (47,6)	180 (53,4)	259 (51,5)	0,257 <sup>b</sup>	58 (50,9)	178 (52,2)	236 (51,9)	0,892 <sup>b</sup>
<b>Fibrilación auricular<sup>2</sup></b>	7 (4,2)	6 (1,8)	13 (2,6)	0,187 <sup>b</sup>	7 (6,1)	28 (8,2)	35 (7,7)	0,606 <sup>b</sup>
<b>Depresión<sup>2</sup></b>	30 (20,5)	61 (21,5)	91 (21,2)	0,921 <sup>b</sup>	10 (10,8)	26 (8,7)	36 (9,2)	0,700 <sup>b</sup>
<b>Tratamientos SNC<sup>1</sup></b>	55 (33,1)	96 (28,5)	151 (30,0)	0,334 <sup>b</sup>	21 (18,4)	61 (17,9)	82 (18,0)	1,000 <sup>b</sup>
<b>IMC<sup>1</sup></b>	27,89 [25,71-31,14]	26,89 [24,46-30,18]	27,51 [24,78-30,42]	0,016 <sup>a</sup>	28,76 [27,33-30,51]	28,58 [26,35-30,81]	28,67 [26,59-30,76]	0,387 <sup>a</sup>
<b>TAS<sup>1</sup></b>	130,00 [120,00-140,00]	130,00 [120,00-140,00]	130,00 [120,00-140,00]	0,172 <sup>a</sup>	135,00 [124,25-143,75]	131,00 [120,00-140,00]	132,00 [120,50-142,00]	0,165 <sup>a</sup>
<b>TAD<sup>1</sup></b>	75,00 [70,00-80,00]	75,00 [70,00-80,00]	75,00 [70,00-80,00]	0,223 <sup>a</sup>	75,50 [68,00-85,00]	78,00 [70,00-85,00]	77,00 [70,00-85,00]	0,228 <sup>a</sup>
<b>Colesterol total<sup>1</sup></b>	200,50 [175,00-228,00]	210,00 [185,75-231,00]	207,50 [182,25-230,75]	0,020 <sup>a</sup>	186,50 [155,50-208,75]	186,00 [161,00-213,75]	186,00 [160,00-212,25]	0,465 <sup>a</sup>
<b>cHDL<sup>1</sup></b>	59,00 [48,00-69,00]	56,00 [49,00-66,00]	57,00 [49,00-67,00]	0,168 <sup>a</sup>	48,00 [40,00-59,00]	48,00 [40,00-55,50]	48,00 [40,00-56,50]	0,384 <sup>a</sup>
<b>REGICOR<sup>2</sup></b>								
RCV bajo	126 (80,8)	252 (78,0)	378 (78,9)	0,747 <sup>b</sup>	27 (29,3)	116 (40,8)	143 (38,0)	0,136 <sup>b</sup>
RCV moderado	25 (16,0)	61 (18,9)	86 (18,0)		46 (50,0)	122 (43,0)	168 (44,7)	
RCV alto	5 (3,2)	10 (3,1)	15 (3,1)		19 (20,7)	46 (16,2)	65 (17,3)	
<b>FRESCO<sup>2</sup></b>								
RCV bajo	95 (90,5)	185 (94,4)	280 (93,0)	0,237 <sup>c</sup>	27 (50,0)	106 (54,9)	133 (53,8)	0,808 <sup>b</sup>
RCV moderado	10 (9,5)	11 (5,6)	21 (7,0)		22 (40,7)	70 (36,3)	92 (37,2)	
RCV alto	0 (0)	0 (0)	0 (0)		5 (9,3)	17 (8,8)	22 (8,9)	

<sup>1</sup> mediana [Q1-Q3]; <sup>2</sup> n (%); <sup>a</sup> prueba U de Mann Whitney; <sup>b</sup> prueba chi-cuadrado; <sup>c</sup> prueba exacta de Fisher.

cHDL: colesterol de lipoproteínas de alta densidad; FRESCO: Función de Riesgo Española de acontecimientos Coronarios y Otros; IMC: índice de masa corporal; RCV: riesgo cardiovascular; REGICOR: Registre Gironí del COR; TAD: tensión arterial diastólica (mmHg); TAS: tensión arterial sistólica (mmHg); tratamientos SNC: tratamientos que modulan el sistema nervioso central.

Tabla suplementaria 6. Características basales de la muestra y consumo de alcohol. Comparación entre las personas participantes con la peor puntuación en la prueba dibujo de relojes frente al resto

	MUJERES				HOMBRES			
	≤ P25 (n = 128)	> P25 (n = 267)	TOTAL (n = 395)	P	≤ P25 (n = 119)	> P25 (n = 246)	TOTAL (n = 365)	P
<b>Edad<sup>1</sup></b>	68,50 [65,00-72,00]	65,00 [61,00-70,00]	66,00 [61,00-71,00]	< 0,001 <sup>a</sup>	69,00 [63,50-73,00]	65,00 [61,00-70,00]	67,00 [62,00-71,00]	< 0,001 <sup>a</sup>
<b>Nivel de estudios<sup>2</sup></b>								
No escolarizado-primarios	109 (86,5)	160 (60,4)	269 (68,8)	< 0,001 <sup>b</sup>	98 (83,1)	116 (48,1)	214 (59,6)	< 0,001 <sup>b</sup>
Secundaria-superiores	17 (13,5)	105 (39,6)	122 (31,2)		20 (16,9)	125 (51,9)	145 (40,4)	
<b>Tipo de convivencia</b>								
Vive solo	21 (16,8%)	46 (17,4%)	67 (17,2%)	1,000 <sup>c</sup>	14 (11,9%)	21 (8,6%)	35 (9,6%)	0,345 <sup>c</sup>
Vive con una o más personas	104 (83,2%)	218 (82,3%)	322 (82,6%)		104 (88,1%)	224 (91,4%)	328 (90,4%)	
Vive en institución	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)		0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	
Otros	0 (0%)	1 (0,4%)	1 (0,3%)		0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	
<b>Tabaquismo<sup>2</sup></b>								
No fumadores	101 (80,2)	160 (60,4)	261 (66,8)	< 0,001 <sup>b</sup>	38 (32,2)	54 (22,0)	92 (25,3)	0,104 <sup>b</sup>
Fumadores	7 (5,6)	46 (17,4)	53 (13,6)		17 (14,4)	44 (17,9)	61 (16,8)	
Exfumadores	18 (14,3)	59 (22,3)	77 (19,7)		63 (53,4)	148 (60,2)	211 (58,0)	
<b>Sedentarismo<sup>2</sup></b>	96 (75,6)	165 (62,3)	261 (66,6)	0,012 <sup>b</sup>	76 (64,4)	146 (59,6)	222 (61,2)	0,443 <sup>b</sup>
<b>Hipertensión<sup>2</sup></b>	77 (60,2)	102 (38,2)	179 (45,3)	< 0,001 <sup>b</sup>	61 (51,3)	120 (48,8)	181 (49,6)	0,739 <sup>b</sup>
<b>Diabetes mellitus<sup>2</sup></b>	19 (14,8)	32 (12,0)	51 (12,9)	0,527 <sup>b</sup>	35 (29,4)	61 (24,8)	96 (26,3)	0,417 <sup>b</sup>
<b>Dislipemia<sup>2</sup></b>	69 (53,9)	131 (49,1)	200 (50,6)	0,428 <sup>b</sup>	51 (42,9)	132 (53,7)	183 (50,1)	0,068 <sup>b</sup>
<b>Fibrilación auricular<sup>2</sup></b>	4 (3,1)	7 (2,6)	11 (2,8)	0,753 <sup>c</sup>	9 (7,6)	21 (8,5)	30 (8,2)	0,909 <sup>b</sup>
<b>Depresión<sup>2</sup></b>	26 (24,8)	48 (21,2)	74 (22,4)	0,566 <sup>b</sup>	14 (15,1)	13 (6,1)	27 (8,8)	0,020 <sup>b</sup>
<b>Tratamientos SNC<sup>1</sup></b>	46 (35,9)	69 (25,8)	115 (29,1)	0,051 <sup>b</sup>	23 (19,3)	42 (17,1)	65 (17,8)	0,703 <sup>b</sup>
<b>IMC<sup>1</sup></b>	27,87 [25,11-31,18]	27,03 [24,48-30,41]	27,41 [24,67-30,54]	0,098 <sup>a</sup>	29,37 [26,33-31,57]	28,55 [26,69-30,53]	28,72 [26,48-30,85]	0,377 <sup>a</sup>
<b>TAS<sup>1</sup></b>	130,00 [120,00-142,00]	130,00 [120,00-140,00]	130,00 [120,00-140,00]	0,155 <sup>a</sup>	134,00 [120,00-145,00]	132,00 [121,25-140,00]	132,00 [121,00-142,00]	0,643 <sup>a</sup>
<b>TAD<sup>1</sup></b>	77,00 [70,00-81,25]	75,00 [70,00-80,00]	75,00 [70,00-80,00]	0,300 <sup>a</sup>	78,00 [70,00-85,00]	78,00 [70,00-84,75]	78,00 [70,00-85,00]	0,742 <sup>a</sup>
<b>Colesterol total<sup>1</sup></b>	207,50 [179,75-228,00]	209,00 [184,00-235,00]	209,00 [183,00-231,00]	0,188 <sup>a</sup>	189,00 [167,00-212,75]	187,00 [160,75-215,00]	188,00 [163,00-215,00]	0,819 <sup>a</sup>
<b>cHDL<sup>1</sup></b>	54,00 [47,00-64,00]	57,50 [49,00-69,00]	56,00 [48,00-67,00]	0,018 <sup>a</sup>	47,00 [38,00-53,00]	47,00 [39,50-55,00]	47,00 [39,00-55,00]	0,744 <sup>a</sup>
<b>REGICOR<sup>2</sup></b>								
RCV bajo	89 (73,6)	203 (78,7)	292 (77,0)	0,540 <sup>b</sup>	32 (31,7)	79 (38,2)	111 (36,0)	0,489 <sup>b</sup>
RCV moderado	27 (22,3)	46 (17,8)	73 (19,3)		47 (46,5)	91 (44,0)	138 (44,8)	
RCV alto	5 (4,1)	9 (3,5)	14 (3,7)		22 (21,8)	37 (17,9)	59 (19,2)	
<b>FRESCO<sup>2</sup></b>								
RCV bajo	66 (86,8)	157 (94,6)	223 (92,1)	0,068 <sup>c</sup>	35 (50,7)	78 (55,3)	113 (53,8)	0,714 <sup>b</sup>
RCV moderado	10 (13,2)	9 (5,4)	19 (7,9)		26 (37,7)	51 (36,2)	77 (36,7)	
RCV alto	0 (0)	0 (0)	0 (0)		8 (11,6)	12 (8,5)	20 (9,5)	

<sup>1</sup> mediana [Q1-Q3]; <sup>2</sup> n (%); <sup>a</sup> prueba U de Mann Whitney; <sup>b</sup> prueba chi-cuadrado; <sup>c</sup> prueba exacta de Fisher.

cHDL: colesterol de lipoproteínas de alta densidad; FRESCO: Función de Riesgo Española de acontecimientos Coronarios y Otros; IMC: índice de masa corporal; RCV: riesgo cardiovascular; REGICOR: Registre Gironí del COR; TAD: tensión arterial diastólica (mmHg); TAS: tensión arterial sistólica (mmHg); tratamientos SNC: tratamientos que modulan el sistema nervioso central.

Tabla suplementaria 7. Características basales de la muestra y consumo de alcohol. Comparación entre las personas participantes con la peor puntuación en el TMTA-1 frente al resto

	MUJERES				HOMBRES			
	≥ P75 (n = 140)	< P75 (n = 359)	TOTAL (n = 499)	P	≥ P75 (n = 105)	< P75 (n = 341)	TOTAL (n = 446)	P
<b>Edad<sup>1</sup></b>	71,00 [66,00-73,00]	66,00 [61,00-70,00]	67,00 [62,00-71,00]	< 0,001 <sup>a</sup>	71,00 [67,00-74,00]	65,00 [61,00-70,00]	67,00 [62,00-71,00]	< 0,001 <sup>a</sup>
<b>Nivel de estudios<sup>2</sup></b>								
No escolarizado-primarios	119 (86,2)	208 (58,4)	327 (66,2)	< 0,001 <sup>b</sup>	91 (87,5)	160 (47,6)	251 (57,0)	< 0,001 <sup>b</sup>
Secundaria-superiores	19 (13,8)	148 (41,6)	167 (33,8)		13 (12,5)	176 (52,4)	189 (43,0)	
<b>Tipo de convivencia</b>								
Vive solo	63 (17,7%)	32 (23,0%)	95 (19,2%)	0,429 <sup>c</sup>	31 (9,1%)	13 (12,4%)	44 (9,9%)	0,547 <sup>b</sup>
Vive con una o más personas	291 (82,0%)	107 (77,0%)	398 (80,6%)		304 (89,7%)	92 (87,6%)	396 (89,2%)	
Vive en institución	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)		3 (0,9%)	0 (0%)	3 (0,7%)	
Otros	1 (0,3%)	0 (0%)	1 (0,2%)		1 (0,3%)	0 (0%)	1 (0,2%)	
<b>Tabaquismo<sup>2</sup></b>								
No fumadores	114 (82,0)	209 (58,9)	323 (65,4)	<0,001 <sup>b</sup>	38 (36,2)	75 (22,1)	113 (25,5)	0,014 <sup>b</sup>
Fumadores	12 (8,6)	49 (13,8)	61 (12,3)		16 (15,2)	57 (16,8)	73 (16,4)	
Exfumadores	13 (9,4)	97 (27,3)	110 (22,3)		51 (48,6)	207 (61,1)	258 (58,1)	
<b>Sedentarismo<sup>2</sup></b>	112 (80,0)	224 (62,9)	336 (67,7)	<0,001 <sup>b</sup>	74 (71,2)	205 (60,7)	279 (63,1)	0,068 <sup>b</sup>
<b>Hipertensión<sup>2</sup></b>	74 (52,9)	157 (43,7)	231 (46,3)	0,083 <sup>b</sup>	55 (52,4)	165 (48,4)	220 (49,3)	0,546 <sup>b</sup>
<b>Diabetes mellitus<sup>2</sup></b>	27 (19,3)	39 (10,9)	66 (13,2)	0,019 <sup>b</sup>	34 (32,4)	80 (23,5)	114 (25,6)	0,088 <sup>b</sup>
<b>Dislipemia<sup>2</sup></b>	71 (50,7)	187 (52,1)	258 (51,7)	0,860 <sup>b</sup>	49 (46,7)	181 (53,1)	230 (51,6)	0,299 <sup>b</sup>
<b>Fibrilación auricular<sup>2</sup></b>	4 (2,9)	9 (2,5)	13 (2,6)	0,763 <sup>c</sup>	12 (11,4)	22 (6,5)	34 (7,6)	0,142 <sup>b</sup>
<b>Depresión<sup>2</sup></b>	31 (26,7)	59 (19,0)	90 (21,1)	0,110 <sup>b</sup>	13 (15,7)	21 (7,0)	34 (8,9)	0,025 <sup>b</sup>
<b>Tratamientos SNC<sup>1</sup></b>	44 (31,4)	105 (29,2)	149 (29,9)	0,712 <sup>b</sup>	24 (22,9)	55 (16,1)	79 (17,7)	0,152 <sup>b</sup>
<b>IMC<sup>1</sup></b>	28,24 [25,72-30,90]	27,29 [24,60-30,41]	27,55 [24,84-30,55]	0,062 <sup>a</sup>	29,30 [27,28-31,13]	28,47 [26,42-30,48]	28,67 [26,54-30,76]	0,152 <sup>a</sup>
<b>TAS<sup>1</sup></b>	132,00 [120,00-142,25]	130,00 [120,00-140,00]	130,00 [120,00-140,00]	0,009 <sup>a</sup>	133,00 [120,00-145,00]	132,00 [120,00-140,00]	132,00 [120,00-141,00]	0,490 <sup>a</sup>
<b>TAD<sup>1</sup></b>	75,00 [70,00-80,00]	75,00 [70,00-80,00]	75,00 [70,00-80,00]	0,552 <sup>a</sup>	75,00 [70,00-80,00]	77,00 [70,00-85,00]	77,00 [70,00-85,00]	0,139 <sup>a</sup>
<b>Colesterol total<sup>1</sup></b>	207,00 [182,50-234,25]	207,50 [182,25-229,00]	207,00 [182,25-230,75]	0,571 <sup>a</sup>	185,50 [159,50-204,25]	186,00 [160,00-214,00]	186,00 [160,00-212,00]	0,537 <sup>a</sup>
<b>cHDL<sup>1</sup></b>	56,00 [47,00-64,00]	58,00 [50,00-68,00]	57,00 [49,00-67,00]	0,015 <sup>a</sup>	47,00 [37,75-55,25]	48,00 [41,00-57,00]	48,00 [40,00-56,75]	0,229 <sup>a</sup>
<b>REGICOR<sup>2</sup></b>								
RCV bajo	101 (78,3)	275 (79,5)	376 (79,2)	0,212 <sup>b</sup>	16 (17,8)	126 (45,0)	142 (38,4)	<0,001 <sup>b</sup>
RCV moderado	21 (16,3)	63 (18,2)	84 (17,7)		50 (55,6)	114 (40,7)	164 (44,3)	
RCV alto	7 (5,4)	8 (2,3)	15 (3,2)		24 (26,7)	40 (14,3)	64 (17,3)	
<b>FRESCO<sup>2</sup></b>								
RCV bajo	66 (84,6)	211 (95,9)	277 (93,0)	0,003 <sup>c</sup>	22 (35,5)	110 (60,8)	132 (54,3)	0,001 <sup>b</sup>
RCV moderado	12 (15,4)	9 (4,1)	21 (7,0)		30 (48,4)	60 (33,1)	90 (37,0)	
RCV alto	0 (0)	0 (0)	0 (0)		10 (16,1)	11 (6,1)	21 (8,6)	

<sup>1</sup> mediana [Q1-Q3]; <sup>2</sup> n (%); <sup>a</sup> prueba U de Mann Whitney; <sup>b</sup> prueba chi-cuadrado; <sup>c</sup> prueba exacta de Fisher.

cHDL: colesterol de lipoproteínas de alta densidad; FRESCO: Función de Riesgo Española de acontecimientos Coronarios y Otros; IMC: índice de masa corporal; RCV: riesgo cardiovascular; REGICOR: Registre Gironí del COR; TAD: tensión arterial diastólica (mmHg); TAS: tensión arterial sistólica (mmHg); tratamientos SNC: tratamientos que modulan el sistema nervioso central; TMTA: Trail Making Test Series A (segundos).

Tabla suplementaria 8. Características basales de la muestra y consumo de alcohol. Comparación entre las personas participantes con la peor puntuación en el TMTA-2 frente al resto

	MUJERES				HOMBRES			
	≥ P75 (n = 134)	< P75 (n = 365)	TOTAL (n = 499)	P	≥ P75 (n = 104)	< P75 (n = 342)	TOTAL (n = 446)	P
<b>Edad<sup>1</sup></b>	70,00 [64,00-73,00]	67,00 [62,00-71,00]	67,00 [62,00-71,00]	< 0,001 <sup>a</sup>	70,50 [66,00-73,00]	65,00 [61,00-70,00]	67,00 [62,00-71,00]	< 0,001 <sup>a</sup>
<b>Nivel de estudios<sup>2</sup></b>								
No escolarizado-primarios	118 (90,1)	209 (57,6)	327 (66,2)	< 0,001 <sup>b</sup>	88 (86,3)	163 (48,2)	251 (57,0)	< 0,001 <sup>b</sup>
Secundaria-superiores	13 (9,9)	154 (42,4)	167 (33,8)		14 (13,7)	175 (51,8)	189 (43,0)	
<b>Tipo de convivencia</b>								
Vive solo	69 (19,1%)	26 (19,7%)	95 (19,3%)	0,925 <sup>c</sup>	31 (9,1%)	13 (12,6%)	44 (9,9%)	0,525 <sup>b</sup>
Vive con 1 o más personas	291 (80,6%)	106 (80,3%)	397 (80,5%)		305 (89,7%)	90 (87,4%)	395 (89,2%)	
Vive en institución	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)		3 (0,9%)	0 (0%)	3 (0,7%)	
Otros	1 (0,3%)	0 (0%)	1 (0,2%)		1 (0,3%)	0 (0%)	1 (0,2%)	
<b>Tabaquismo<sup>2</sup></b>								
No fumadores	105 (79,5)	218 (60,2)	323 (65,4)	<0,001 <sup>b</sup>	40 (38,8)	73 (21,4)	113 (25,5)	0,001 <sup>b</sup>
Fumadores	13 (9,8)	48 (13,3)	61 (12,3)		12 (11,7)	61 (17,9)	73 (16,4)	
Exfumadores	14 (10,6)	96 (26,5)	110 (22,3)		51 (49,5)	207 (60,7)	258 (58,1)	
<b>Sedentarismo<sup>2</sup></b>	111 (83,5)	225 (62,0)	336 (67,7)	<0,001 <sup>b</sup>	67 (64,4)	212 (62,7)	279 (63,1)	0,843 <sup>b</sup>
<b>Hipertensión<sup>2</sup></b>	79 (59,0)	152 (41,6)	231 (46,3)	<0,001 <sup>b</sup>	48 (46,2)	172 (50,3)	220 (49,3)	0,531 <sup>b</sup>
<b>Diabetes mellitus<sup>2</sup></b>	28 (20,9)	38 (10,4)	66 (13,2)	0,004 <sup>b</sup>	35 (33,7)	79 (23,1)	114 (25,6)	0,042 <sup>b</sup>
<b>Dislipemia<sup>2</sup></b>	68 (50,7)	190 (52,1)	258 (51,7)	0,874 <sup>b</sup>	43 (41,3)	187 (54,7)	230 (51,6)	0,023 <sup>b</sup>
<b>Fibrilación auricular<sup>2</sup></b>	3 (2,2)	10 (2,7)	13 (2,6)	1,000 <sup>c</sup>	11 (10,6)	23 (6,7)	34 (7,6)	0,278 <sup>b</sup>
<b>Depresión<sup>2</sup></b>	31 (26,7)	59 (19,0)	90 (21,1)	0,110 <sup>b</sup>	11 (13,6)	23 (7,6)	34 (8,9)	0,143 <sup>b</sup>
<b>Tratamientos SNC<sup>1</sup></b>	46 (34,3)	103 (28,2)	149 (29,9)	0,226 <sup>b</sup>	20 (19,2)	59 (17,3)	79 (17,7)	0,752 <sup>b</sup>
<b>IMC<sup>1</sup></b>	28,25 [25,57-31,39]	27,25 [24,70-30,24]	27,55 [24,84-30,55]	0,013 <sup>a</sup>	29,01 [27,20-31,27]	28,55 [26,41-30,47]	28,67 [26,54-30,76]	0,134 <sup>a</sup>
<b>TAS<sup>1</sup></b>	131,00 [121,00-145,00]	130,00 [120,00-140,00]	130,00 [120,00-140,00]	0,006 <sup>a</sup>	135,00 [120,75-144,25]	131,50 [120,00-140,00]	132,00 [120,00-141,00]	0,428 <sup>a</sup>
<b>TAD<sup>1</sup></b>	75,50 [70,00-80,75]	75,00 [70,00-80,00]	75,00 [70,00-80,00]	0,446 <sup>a</sup>	75,00 [70,00-80,00]	77,00 [70,00-85,00]	77,00 [70,00-85,00]	0,064 <sup>a</sup>
<b>Colesterol total<sup>1</sup></b>	201,50 [177,25-228,00]	208,50 [184,00-231,00]	207,00 [182,25-230,75]	0,149 <sup>a</sup>	183,00 [160,00-208,50]	187,50 [159,50-213,00]	186,00 [160,00-212,00]	0,613 <sup>a</sup>
<b>cHDL<sup>1</sup></b>	56,00 [47,00-64,00]	58,00 [50,00-68,00]	57,00 [49,00-67,00]	0,017 <sup>a</sup>	46,00 [38,00-54,50]	48,00 [40,00-57,50]	48,00 [40,00-56,75]	0,134 <sup>a</sup>
<b>REGICOR<sup>2</sup></b>								
RCV bajo	92 (73,0)	284 (81,4)	376 (79,2)	0,027 <sup>b</sup>	21 (22,8)	121 (43,5)	142 (38,4)	<0,001 <sup>b</sup>
RCV moderado	26 (20,6)	58 (16,6)	84 (17,7)		47 (51,1)	117 (42,1)	164 (44,3)	
RCV alto	8 (6,3)	7 (2,0)	15 (3,2)		24 (26,1)	40 (14,4)	64 (17,3)	
<b>FRESCO<sup>2</sup></b>								
RCV bajo	61 (85,9)	216 (95,2)	277 (93,0)	0,014 <sup>c</sup>	30 (45,5)	102 (57,6)	132 (54,3)	0,117 <sup>b</sup>
RCV moderado	10 (14,1)	11 (4,8)	21 (7,0)		27 (40,9)	63 (35,6)	90 (37,0)	
RCV alto	0 (0)	0 (0)	0 (0)		9 (13,6)	12 (6,8)	21 (8,6)	

<sup>1</sup> mediana [Q1-Q3]; <sup>2</sup> n (%); <sup>a</sup> prueba U de Mann Whitney; <sup>b</sup> prueba chi-cuadrado; <sup>c</sup> prueba exacta de Fisher.

cHDL: colesterol de lipoproteínas de alta densidad; FRESCO: Función de Riesgo Española de acontecimientos Coronarios y Otros; IMC: índice de masa corporal; RCV: riesgo cardiovascular; REGICOR: Registre Gironí del COR; TAD: tensión arterial diastólica (mmHg); TAS: tensión arterial sistólica (mmHg); tratamientos SNC: tratamientos que modulan el sistema nervioso central; TMTA: Trail Making Test Series A (segundos).



Tabla suplementaria 9. Características basales de la muestra y consumo de alcohol. Comparación entre las personas participantes con mayor puntuación en la prueba errores TMTA-1 frente al resto

	MUJERES				HOMBRES			
	≥ P75 (n = 147)	< P75 (n = 355)	TOTAL (n = 502)	P	≥ P75 (n = 104)	< P75 (n = 342)	TOTAL (n = 446)	P
<b>Edad<sup>1</sup></b>	70,00 [66,00-72,50]	66,00 [61,00-71,00]	67,00 [62,00-71,00]	< 0,001 <sup>a</sup>	69,50 [65,00-73,00]	66,00 [61,00-71,00]	67,00 [62,00-71,00]	< 0,001 <sup>a</sup>
<b>Nivel de estudios<sup>2</sup></b>								
No escolarizado-primarios	105 (71,9)	223 (63,5)	328 (66,0)	0,090 <sup>b</sup>	65 (63,1)	187 (55,5)	252 (57,3)	0,210 <sup>b</sup>
Secundaria-superiores	41 (28,1)	128 (36,5)	169 (34,0)		38 (36,9)	150 (44,5)	188 (42,7)	
<b>Tipo de convivencia</b>								
Vive solo	58 (16,5%)	37 (2,5%)	95 (19,1%)	0,035 <sup>c</sup>	37 (10,9%)	7 (6,7%)	44 (9,9%)	0,572 <sup>b</sup>
Vive con una o más personas	293 (83,2%)	108 (74,5%)	401 (80,7%)		300 (88,2%)	96 (92,3%)	396 (89,2%)	
Vive en institución	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)		2 (0,6%)	1 (1,0%)	3 (0,7%)	
Otros	1 (0,3%)	0 (0%)	1 (0,2%)		1 (0,3%)	0 (0%)	1 (0,2%)	
<b>Tabaquismo<sup>2</sup></b>								
No fumadores	98 (67,1)	227 (64,7)	325 (65,4)	0,679 <sup>b</sup>	32 (31,1)	81 (23,8)	113 (25,5)	0,117 <sup>b</sup>
Fumadores	15 (10,3)	46 (13,1)	61 (12,3)		20 (19,4)	52 (15,2)	72 (16,2)	
Exfumadores	33 (22,6)	78 (22,2)	111 (22,3)		51 (49,5)	208 (61,0)	259 (58,3)	
<b>Sedentarismo<sup>2</sup></b>	117 (79,6)	220 (62,5)	337 (67,5)	<0,001 <sup>b</sup>	76 (74,5)	204 (60,0)	280 (63,3)	0,011 <sup>b</sup>
<b>Hipertensión<sup>2</sup></b>	80 (54,4)	151 (42,5)	231 (46,0)	0,020 <sup>b</sup>	54 (51,9)	166 (48,5)	220 (49,3)	0,622 <sup>b</sup>
<b>Diabetes mellitus<sup>2</sup></b>	24 (16,3)	43 (12,1)	67 (13,3)	0,263 <sup>b</sup>	32 (30,8)	82 (24,0)	114 (25,6)	0,207 <sup>b</sup>
<b>Dislipemia<sup>2</sup></b>	77 (52,4)	182 (51,3)	259 (51,6)	0,897 <sup>b</sup>	56 (53,8)	175 (51,2)	231 (51,8)	0,714 <sup>b</sup>
<b>Fibrilación auricular<sup>2</sup></b>	6 (4,1)	7 (2,0)	13 (2,6)	0,296 <sup>b</sup>	7 (6,7)	27 (7,9)	34 (7,6)	0,857 <sup>b</sup>
<b>Depresión<sup>2</sup></b>	23 (17,7)	69 (23,1)	92 (21,4)	0,262 <sup>b</sup>	11 (12,6)	23 (7,7)	34 (8,9)	0,230 <sup>b</sup>
<b>Tratamientos SNC<sup>1</sup></b>	55 (37,4)	96 (27,0)	151 (30,1)	0,028 <sup>a</sup>	27 (26,0)	52 (15,2)	79 (17,7)	0,018 <sup>b</sup>
<b>IMC<sup>1</sup></b>	27,95 [24,03-30,77]	27,43 [24,96-30,41]	27,55 [24,82-30,56]	0,900 <sup>a</sup>	29,07 [27,25-30,48]	28,55 [26,37-30,76]	28,67 [26,54-30,76]	0,402 <sup>a</sup>
<b>TAS<sup>1</sup></b>	130,00 [120,00-140,00]	130,00 [120,00-140,00]	130,00 [120,00-140,00]	0,189 <sup>a</sup>	132,00 [120,00-140,25]	132,00 [120,00-141,00]	132,00 [120,00-141,00]	0,808 <sup>a</sup>
<b>TAD<sup>1</sup></b>	75,00 [70,00-80,00]	75,00 [70,00-80,00]	75,00 [70,00-80,00]	0,327 <sup>a</sup>	75,00 [70,00-83,50]	78,00 [70,00-85,00]	77,00 [70,00-85,00]	0,409 <sup>a</sup>
<b>Colesterol total<sup>1</sup></b>	201,00 [176,50-226,00]	209,00 [184,00-232,00]	207,00 [182,00-231,00]	0,109 <sup>a</sup>	177,50 [149,25-204,00]	188,00 [162,00-214,00]	186,00 [160,00-212,00]	0,039 <sup>a</sup>
<b>cHDL<sup>1</sup></b>	57,00 [48,00-66,00]	57,00 [49,00-68,00]	57,00 [49,00-67,00]	0,515 <sup>a</sup>	47,00 [39,00-56,00]	48,00 [40,00-57,00]	48,00 [40,00-57,00]	0,877 <sup>a</sup>
<b>REGICOR<sup>2</sup></b>								
RCV bajo	108 (80,6)	270 (78,5)	378 (79,1)	0,750 <sup>b</sup>	33 (39,8)	110 (38,3)	143 (38,6)	0,185 <sup>b</sup>
RCV moderado	23 (17,2)	62 (18,0)	85 (17,8)		31 (37,3)	133 (46,3)	164 (44,3)	
RCV alto	3 (2,2)	12 (3,5)	15 (3,1)		19 (22,9)	44 (15,3)	63 (17,0)	
<b>FRESCO<sup>2</sup></b>								
RCV bajo	74 (90,2)	205 (94,0)	279 (93,0)	0,309 <sup>c</sup>	25 (46,3)	108 (57,1)	133 (54,7)	0,256 <sup>b</sup>
RCV moderado	8 (9,8)	13 (6,0)	21 (7,0)		22 (40,7)	67 (35,4)	89 (36,6)	
RCV alto	0 (0)	0 (0)	0 (0)		7 (13,0)	14 (7,4)	21 (8,6)	

<sup>1</sup> mediana [Q1-Q3]; <sup>2</sup> n (%); <sup>a</sup> prueba U de Mann Whitney; <sup>b</sup> prueba chi-cuadrado; <sup>c</sup> prueba exacta de Fisher.

cHDL: colesterol de lipoproteínas de alta densidad; FRESCO: Función de Riesgo Española de acontecimientos Coronarios y Otros; IMC: índice de masa corporal; RCV: riesgo cardiovascular; REGICOR: Registre Gironí del COR; TAD: tensión arterial diastólica (mmHg); TAS: tensión arterial sistólica (mmHg); tratamientos SNC: tratamientos que modulan el sistema nervioso central; TMTA: Trail Making Test Series A (segundos).

Tabla suplementaria 10. Características basales de la muestra y consumo de alcohol. Comparación entre las personas participantes con mayor puntuación en la prueba errores TMTA-2 frente al resto

	MUJERES				HOMBRES			
	≥ P75 (n = 149)	< P75 (n = 353)	TOTAL (n = 502)	P	≥ P75 (n = 103)	< P75 (n = 343)	TOTAL (n = 446)	P
<b>Edad<sup>1</sup></b>	69,00 [64,00-72,00]	67,00 [62,00-71,00]	67,00 [62,00-71,00]	0,006 <sup>a</sup>	70,00 [65,00-73,00]	65,00 [61,00-70,50]	67,00 [62,00-71,00]	< 0,001 <sup>a</sup>
<b>Nivel de estudios<sup>2</sup></b>								
No escolarizado-primarios	101 (68,2)	227 (65,0)	328 (66,0)	0,558 <sup>b</sup>	72 (71,3)	179 (52,8)	251 (57,0)	0,001 <sup>b</sup>
Secundaria-superiores	47 (31,8)	122 (35,0)	169 (34,0)		29 (28,7)	160 (47,2)	189 (43,0)	
<b>Tipo de convivencia</b>								
Vive solo	66 (18,9%)	29 (19,7%)	95 (19,1%)	0,357 <sup>c</sup>	40 (11,7%)	4 (3,9%)	44 (9,9%)	0,023 <sup>b</sup>
Vive con una o más personas	284 (81,1%)	117 (79,6%)	401 (80,7%)		299 (87,4%)	97 (95,1%)	396 (89,2%)	
Vive en institución	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)		3 (0,9%)	0 (0%)	3 (0,7%)	
Otros	0 (0%)	1 (0,7%)	1 (0,2%)		0 (0%)	1 (1,0%)	1 (0,2%)	
<b>Tabaquismo<sup>2</sup></b>								
No fumadores	102 (69,4)	223 (63,7)	325 (65,4)	0,479 <sup>b</sup>	26 (25,7)	87 (25,4)	113 (25,5)	0,896 <sup>b</sup>
Fumadores	16 (10,9)	45 (12,9)	61 (12,3)		18 (17,8)	55 (16,0)	73 (16,4)	
Exfumadores	29 (19,7)	82 (23,4)	111 (22,3)		57 (56,4)	201 (58,6)	258 (58,1)	
<b>Sedentarismo<sup>2</sup></b>	114 (76,5)	223 (63,7)	337 (67,5)	0,007 <sup>b</sup>	69 (67,6)	210 (61,8)	279 (63,1)	0,336 <sup>b</sup>
<b>Hipertensión<sup>2</sup></b>	64 (43,0)	167 (47,3)	231 (46,0)	0,426 <sup>b</sup>	55 (53,4)	165 (48,1)	220 (49,3)	0,407 <sup>b</sup>
<b>Diabetes mellitus<sup>2</sup></b>	22 (14,8)	45 (12,7)	67 (13,3)	0,643 <sup>b</sup>	33 (32,0)	81 (23,6)	114 (25,6)	0,112 <sup>b</sup>
<b>Dislipemia<sup>2</sup></b>	78 (52,3)	181 (51,3)	259 (51,6)	0,903 <sup>b</sup>	50 (48,5)	180 (52,5)	230 (51,6)	0,556 <sup>b</sup>
<b>Fibrilación auricular<sup>2</sup></b>	7 (4,7)	6 (1,7)	13 (2,6)	0,104 <sup>b</sup>	7 (6,8)	27 (7,9)	34 (7,6)	0,882 <sup>b</sup>
<b>Depresión<sup>2</sup></b>	33 (25,4)	59 (19,7)	92 (21,4)	0,237 <sup>b</sup>	10 (12,2)	24 (7,9)	34 (8,9)	0,326 <sup>b</sup>
<b>Tratamientos SNC<sup>1</sup></b>	55 (36,9)	96 (27,2)	151 (30,1)	0,039 <sup>b</sup>	20 (19,4)	59 (17,2)	79 (17,7)	0,712 <sup>b</sup>
<b>IMC<sup>1</sup></b>	27,85 [24,45-30,44]	27,29 [24,97-30,67]	27,55 [24,82-30,56]	0,927 <sup>a</sup>	28,56 [26,96-30,86]	28,69 [26,43-30,64]	28,67 [26,54-0,76]	0,921 <sup>a</sup>
<b>TAS<sup>1</sup></b>	129,00 [120,00-140,00]	130,00 [120,00-140,00]	130,00 [120,00-140,00]	0,629 <sup>a</sup>	130,00 [121,00-140,00]	132,00 [120,00-142,00]	132,00 [120,00-141,00]	0,560 <sup>a</sup>
<b>TAD<sup>1</sup></b>	75,00 [70,00-80,00]	75,00 [70,00-80,00]	75,00 [70,00-80,00]	0,263 <sup>a</sup>	75,00 [70,00-80,00]	78,00 [70,00-85,00]	77,00 [70,00-85,00]	0,081 <sup>a</sup>
<b>Colesterol total<sup>1</sup></b>	200,00 [174,00-221,00]	210,50 [185,00-232,25]	207,00 [182,00-231,00]	0,002 <sup>a</sup>	183,00 [149,00-210,00]	186,00 [163,00-212,75]	186,00 [160,00-212,00]	0,200 <sup>a</sup>
<b>cHDL<sup>1</sup></b>	57,50 [48,00-70,25]	56,00 [49,00-66,00]	57,00 [49,00-67,00]	0,345 <sup>a</sup>	49,00 [39,50-58,00]	47,00 [40,00-56,00]	48,00 [40,00-56,75]	0,413 <sup>a</sup>
<b>REGICOR<sup>2</sup></b>								
RCV bajo	115 (82,7)	263 (77,6)	378 (79,1)	0,312 <sup>b</sup>	33 (38,4)	109 (38,4)	142 (38,4)	0,760 <sup>b</sup>
RCV moderado	19 (13,7)	66 (19,5)	85 (17,8)		36 (41,9)	128 (45,1)	164 (44,3)	
RCV alto	5 (3,6)	10 (2,9)	15 (3,1)		17 (19,8)	47 (16,5)	64 (17,3)	
<b>FRESCO<sup>2</sup></b>								
RCV bajo	81 (94,2)	198 (92,5)	279 (93,0)	0,803 <sup>c</sup>	25 (49,0)	107 (55,7)	132 (54,3)	0,564 <sup>b</sup>
RCV moderado	5 (5,8)	16 (7,5)	21 (7,0)		20 (39,2)	70 (36,5)	90 (37,0)	
RCV alto	0 (0)	0 (0)	0 (0)		6 (11,8)	15 (7,8)	21 (8,6)	

<sup>1</sup> mediana [Q1-Q3]; <sup>2</sup> n (%); <sup>a</sup> prueba U de Mann Whitney; <sup>b</sup> prueba chi-cuadrado; <sup>c</sup> prueba exacta de Fisher.

cHDL: colesterol de lipoproteínas de alta densidad; FRESCO: Función de Riesgo Española de acontecimientos Coronarios y Otros; IMC: índice de masa corporal; RCV: riesgo cardiovascular; REGICOR: Registre Gironí del COR; TAD: tensión arterial diastólica (mmHg); TAS: tensión arterial sistólica (mmHg); tratamientos SNC: tratamientos que modulan el sistema nervioso central; TMTA: Trail Making Test Series A (segundos).